40408-홍역예방수칙_러시아어	1
40408-홍역예방수칙_러시아어2	2
40408-홍역예방수칙_러시아어3	3
40408-홍역예방수칙_러시아어4	
40408-홍역예방수칙_러시아어5······	5
40408-홍역예방수칙_러시아어6	6
40408-홍역예방수칙_러시아어7	7





Если готовитесь к поездке за границу?

Советы по профилактике кори Узнать и провести профилактику заранее!





Определение и симптомы кори

Это инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём, например при кашле или чихании, и характеризуется высокой заразностью.

Ж Люди с недостаточным иммунитетом к кори заражаются более чем в 90% случаев при контакте с больным.

Основные симптомы кори

(инкубационный период 7-21 день)

Продромальный период



Период появления сыпи



Период восстановления



Это очень заразный период, вызывающий лихорадку, кашель, насморк, конъюктивит и пятна на слизистой ротовой полости.



Эритематозная сыпь появляется на задней поверхности шеи, под ушами, на туловище, конечностях, кистях и подошвах.



Сыпь исчезает, оставляя после себя пигментацию.

ЖМогут возникнуть осложнения, такие как респираторные заболевания, бронхиальная пневмония и круп, диарея и острый энцефалит.




• Страны с крупными вспышками кори •

Число случаев заболевания корью растёт* во всём мире, и вероятность заражения людей корью возрастает из-за увеличения числа поездок за рубеж.

• Распределение случаев заболевания корью по регионам •


Спорадические вспышки и эпидемии продолжаются, главным образом, в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.



* В 2023 году число случаев заболевания корью во всём мире составляет приблизительно 300.000 (в 1,8 раза больше, чем в 2022 году, по данным ВОЗ)



Советы по профилактике кори во время поездок за границу



Перед поездкой

- Проверьте, получили ли вы обе дозы вакцины против кори (ММR)
- Если вы не были вакцинированы дважды или не уверены, были ли вы вакцинированы, посетите медицинское учреждение за 4-6 недель до отъезда и получите две дозы вакцины с интервалом в 4 недели.





Во время поездки

В местах массового скопления людей соблюдайте правила личной гигиены, такие как ношение маски, мытьё рук и соблюдение этикета при кашле.





При въезде в страну

Если при въезде в страну у вас поднялась температура или появилась сыпь, сообщите об этом сотруднику карантинной службы.



При появлении подозрительных симптомов, таких как лихорадка или сыпь, после въезда в страну




Посетите медицинское учреждение, надев маску и сведя к минимуму контакты с окружающими

(воздержитесь от пользования общественным транспортом)



Сообщите медицинскому персоналу свою "историю зарубежных поездок"





Что нужно знать о вакцинации против кори

Критерии вакцинации против кори по возрастам

Возраст	Способ вакцинации
Дети в возрасте от 0 до 5 месяцев	Не подлежат вакцинации
От 6 до 11 месяцев (ускоренная вакцинация*) * Применяется, когда невозможно неукоснительно соблюдать стандартный график вакцинации и когда необходимо быстро приобрести иммунитет	Одноразовая вакцинация при выезде за границу ** Вакцинация против ММК в возрасте до 12 месяцев не входит в число прививок, поэтому в будущем требуется 2 прививки в соответствии со стандартным графиком вакцинации.
Возраст 12-15 месяцев (своевременная вакцинация)	1-я вакцинация
4-6 лет (своевременная вакцинация)	2-я вакцинация
Подростки и взрослые*	Ж При отсутствии признаков иммунитета Делают прививку 2 раза (минимум 1 раз) с интервалом не менее 4 недель

^{*} Если вы родились до 1 января 1968 года, считается, что у вас естественный иммунитет к кори, и прививка не требуется.

Ж Случаи без признаков наличия иммунитета к кори

Лица, родившиеся после 1 января 1968 года, у которых в прошлом не было прививок и которые никогда не болели корью, или у которых нет подтверждённых антител к кори.





приятного путешествия! прездкой за границу и префилактики кориперед ознакомътесь справилами

